Mannitoltest

Formål
Formålet med denne undersøgelse er at vurdere om du har astma.

Hvad er Mannitol
Mannitol er et sukkerstof, som ved indånding giver en kortvarig let udtørring af slimhinden i lungerne. Det kan give en forbigående forsnævring af luftvejene, hvis du har astma.
Mannitol optages ikke i kroppen, derfor er der ingen specielle forholdsregler, hvis du har diabetes.

Udførelse af undersøgelsen
Du får målt din lungefunktion. Derefter indånder du Mannitol i stigende doser via en inhalator. Efter hver inhalation måler vi din lungefunktion.
Udløser undersøgelsen et mindre fald i lungefunktionen, kan det være tegn på astma. Testen afsluttes og du vil få luftvejsudvidende medicin.

Varighed af testen
Undersøgelsen varer ca. 45 minutter.
Beregn op til 1½ time, hvis du skal tale med lægen bagefter.

Gener under og efter undersøgelsen
Under testen kan der forekomme hoste, tørhed i svælget og halsen samt let åndenød.
Generne forsvinder kort efter testens afslutning.
Der er ingen særlige forholdsregler efter testen.

Forberedelse til undersøgelsen
- Ingen rygning 8 timer før undersøgelsen
- Undgå større fysisk aktivitet på undersøgelsesdagen (inden undersøgelsen)

Medicin du skal undgå
Får du astmamedicin, skal du holde pause med den. Se venligst det udleverede bilag for hvor længe du skal pause med din astmamedicin.

Anden medicin
Al anden medicin skal du tage som du plejer.

Hvornår kan undersøgelsen *ikke* laves?
- Ved luftvejsinfektion inden for de sidste 2 uger
- Ved graviditet eller amning
- Hvis du er i antibiotikabehandling pga. en infektion i lungerne
- Du må ikke for nylig have fået foretaget en større operation i maven eller brystet
- Forhøjet ubehandlet Blodtryk
- Nyligt slagtilfælde eller hjerteanfald

Efter undersøgelsen
Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter undersøgelsen.
Du kan selv køre hjem.

Svar på undersøgelsen
Du får svar på undersøgelsen ved den efterfølgende konsultation hos speciallægen. Din praktiserende læge får svar på undersøgelsen, medmindre du har frabedt dig dette.

Kontakt venligst klinikken:
- Hvis du har glemt at holde pause med din astmamedicin eller antihistamin inden undersøgelsen.
- Hvis du får anden medicin for luftvejene, eller hvis du mener at du ikke kan undvære din astma medicin.
- Hvis du er blevet forhindret i at møde til aftalte tid. Afbud skal være os i hænde senest kl. 15:00 dagen før din aftale.

Ved spørgsmål, bookning eller ændring af tider bedes du kontakte os:

Telefon: 33 13 65 13
Telefontid mandag – torsdag kl. 8.00 – 10.00
Telefonsvarer hele døgnet

Du kan også benytte sikker mail via Patientportalen. Se venligst link til Patientportalen på vores hjemmeside www.lungeogallergi.dk